

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

Dossier Clinique

Un homme de 40 ans est conduit aux urgences après une rixe.

Il se plaint d'une vive douleur à la mandibule et présente un hématome en regard de la branche horizontale mandibulaire gauche, ainsi que des érosions cutanées de la face.

A l'examen clinique, vous notez :

- ~~/~~ Une douleur exquise à la palpation du bord basilaire de la branche horizontale gauche
- ~~/~~ Une douleur à la palpation prétragienne droite
- ~~/~~ Une béance antéro-latérale gauche
- ~~/~~ Un contact molaire prématuré gauche
- ~~/~~ Une plaie muqueuse entre les dents 35 et 36
- ~~/~~ Un diastème entre ces mêmes dents
- ~~/~~ Un hématome du plancher buccal en regard


Il n'y a pas de trouble de la conscience, l'abdomen est souple, on ne retrouve pas de signe évocateur de fracture d'un membre.

1. Quel diagnostic évoquez-vous ?


2. Quel signe fondamental avez-vous omis de rechercher ?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their answer to question 2.

3. Quel(s) examen(s) réalisez-vous pour confirmer votre diagnostic ?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their answer to question 3.

4. Indiquez brièvement les principes de votre traitement, sachant que l'une des fractures diagnostiquées est articulaire.



CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

Dossier Clinique

REPONSES

QUESTION 1

Fracture bifocale de la mandibule : une fracture ouverte de la branche horizontale gauche passant entre les dents 35 et 36 et une fracture condylienne droite.

QUESTION 2

Signe de Vincent : hypoesthésie labiomentonnaire gauche dans le territoire du V3 gauche

QUESTION 3

Panoramique dentaire, incidence de face basse, éventuellement scanner pour mieux visualiser la fracture condylienne

QUESTION 4

Le traitement est chirurgical, il s'agit d'une urgence.
Au bloc opératoire sous anesthésie générale
Réduction et contention des fractures
Ostéosynthèse de la fracture de la branche horizontale
Rééducation de l'articulation temporo-mandibulaire droite
Alimentation liquide stricte pendant 6 semaines